



Questionnaire: fertilité et métabolisme

Exploitation: No:

- Animaux atteints vaches génisses
 primipares surtout animaux de l'exploitation
 surtout animaux achetés / ayant été sur un alpage

- Répartition des vélâges: toute l'année
 saisonnier

Déroulement de la période puerpérale

Premières chaleurs post-partum: semaines p.p.
Anoestrie durant les 6 premières semaines p.p.: pourcentage (%)
Mesures prises: dès semaines p.p.

Chaleurs suivantes: intensité:
 régularité:

Sécrétions vaginales: pourcentage d'animaux avec infection jusqu'à 3 semaines p.p: (%)
 pourcentage d'animaux avec infection après 3 semaines p.p: (%)

Observation des chaleurs et moment de l'insémination

Observation des chaleurs (méthode et symptômes principaux):

Nombre d'observations à l'écurie (hors des périodes d'affouragement et de traite):

- Calendrier des chaleurs: oui non
 autre système:

- Signes de chaleurs: bon mauvais
- Durée des chaleurs: court normal long
- Glaïres: souvent rarement
- beaucoup peu
- transparentes troubles
- IA monte naturelle propre taureau taureau étranger
- Moment de l'IA: début milieu fin des chaleurs

Première insémination

des génisses d'après: l'âge: le poids: la saison:

Santé animale

(prière de donner le nombre d'animaux atteints de maladie ces derniers 12 mois)

- Stérilité: chaleurs muettes:.....
- acyclie:
- kystes:
- retour en chaleur:.....
- sécrétions vaginales:.....
- métrite:

Phase puerpérale: rétention placentaire:

- Avortement: précoce tardif
- Âge des foetus:

- Métabolisme: hypocalcémie (fièvre du lait):
- acétonémie:
- hypomagnésémie (tétanie d'herbage):.....

Mammites: mammites aiguës mammites chroniques

Onglons: fourbure ulcères

paroi décollée

Autres maladies:

Parasites: douves autres:

.....

Maladies veaux: maladie du muscle blanc diarrhée:

pneumonie autres:

Remarques:.....

.....